



TOTALITÉ DES DENTS ABSENTES - OPTIONS

Lorsque toutes les dents sont absentes, plusieurs traitements sont possibles.


La première option est la mise en place d'une prothèse amovible. Une telle prothèse repose sur les crêtes édentées sans être fixée à l'os de la mâchoire.




Une autre option consiste à choisir un traitement implantaire. Les implants sont fixés dans l'os maxillaire et jouent le même rôle que les racines des dents naturelles.



Après quelques années, la prothèse doit être rebasée afin de s'adapter à la nouvelle forme de la crête édentée.





La prothèse amovible est au départ ajustée à l'os maxillaire de chaque patient. Cependant, l'os se résorbant avec le temps, la prothèse amovible devient lâche. Ce ballotement endolorit les gencives et gêne la mastication ainsi que l'élocution.



Par ailleurs, la progression de la perte osseuse complique de plus en plus la stabilisation de la prothèse. Cette perte osseuse, diminuant l'épaisseur de l'os, empêche la protection des troncs nerveux sous-jacents des pressions et des morsures. De telles pressions peuvent occasionner une douleur intense et un extrême inconfort.

Ce phénomène peut s'avérer particulièrement déplaisant pour le patient qui doit se livrer à ces ajustements répétés de la prothèse au cours de nombreuses années.

L'unique façon reconnue d'empêcher ou de stopper la perte osseuse est de remplacer les racines naturelles par des implants dentaires.



Les implants dentaires apportent une solution stable et durable qui réduit les douleurs, l'inconfort, l'instabilité et la perte osseuse que connaissent les patients porteurs de prothèse.

